

水稻

斑点米カメムシを防ぐ

防除の適期

1回目	穂ぞろい期
2回目	1回目の防除から1週間後
3回目 (多発時)	2回目の防除から1週間前後

病害虫体系防除・薬剤一覧

	1回目	2回目	多発時
粉剤	イッカツエース	ビームスタークル	スタークル 粉剤 スタークル 液剤
	ハスラーS		
粒剤	ゴウケツモンスター		
豆つぶ剤	スタークル豆つぶ		
液剤	カスラバリダジョー	ビームエイトス タークルゾル	
	カーフロアブル		

※上記薬剤はカメムシ以外の病害虫にも効果がある混合剤を含んでいます。適用病害虫や使用量、時期など栽培歴で確認の上、使用してください。

薬剤防除と草刈りが基本
斑点米カメムシは雑草地で繁殖し、出穂後に水田へ侵入して稲穂を加害します。米の品質低下を招き、農家所得の減少にもつながりかねません。出穂14日前までに畦畔の草刈りを済ませ、出穂後には薬剤散布による防除を徹底します。

スタークル豆つぶ剤
畦畔から投げ込むだけ



スタークル豆つぶ 250g/10a 税込3,539円

畦畔から軽く投げ込むカメムシ防除剤です。10a当たりの使用量はわずか250gで、散布作業を大幅に省力します。水面を自己拡散して効果を発揮しますので、十分な湛水が必要です。



畦畔から手まきで散布できます。

Q 畦畔雑草を処理する除草剤「ダイロン+ザクサ」の上手な使い方をお教えください。

- A** 雑草が大きくなる前に散布するのが効果的です。
- ①面積当たりの十分量をしっかりと散布してください。散布液量が不足すると効果不足の原因になります。
 - ②ダイロンゾルは土壌に処理層を作

ることで効果を発揮します。土にも薬液がよくかかるよう、雑草が大きくなる前に散布してください。目安として草丈15cm程度。専用ノズルもあります。

③ダイロンゾルは沈殿しやすいので、調合時に先に入れ、時々よく混ぜて使ってください。

例) 20ℓの場合



「ザクサ液剤」と「ダイロンゾル」の混用散布により、生えている雑草を枯らして、その後の発生を抑えます。面積当たりの十分量をしっかりと散布してください。

防除作業で困った時は
農業経営センターへ相談

防除作業でお困りの時には、JA農業経営センターがニーズに応じて作業を受委託します。「真夏の散布がづらい」「散布器具がない」「忙しくて適期に防除できない」「急病やけがで人手がいない」など、気軽に相談ください。農業経営センター
(☎72・3074)

せり情報

6月2日

雌の引き合い強



トップ賞

	雌	去勢
名号	としざくら	39美津西
価格	648,000円	867,240円
日令	283日	240日
体重	273kg	274kg
父	美国桜	美津百合
母	としこ	ふくにし3
母の父	平茂勝	沢茂勝
母の祖父	鶴山土井	福栄

※トップ賞には日令制限があり、成績表の最高価格とは異なる場合があります。

成績表

区分	雌	去勢	総合	
売買頭数	阿新	16	32	48
	全体	106	180	286
最高価格	阿新	919,080	910,440	919,080
	全体	2,097,360	922,320	2,097,360
平均価格	阿新	648,270	751,275	716,940
	全体	660,225	755,463	718,426
平均体重	阿新	324	300	308
	全体	270	297	285
kg単価	阿新	2,002	2,503	2,327
	全体	2,443	2,570	2,523

